

Звертаємо увагу, що Вам проведено хірургічне втручання, тому протягом 10 днів необхідно дотримуватись наступних рекомендацій:

- Щоб зменшити набряк, протягом перших годин після видалення прикладайте ззовні холод.
- Щоб зупинити незначну кровотечу, яка є нормальною після видалення, на місце видаленого зуба на 15 хвилин треба накласти тампон, змочений соляним розчином (на 1 склянку води 1 чайна ложка солі).
- Для профілактики набряків уникайте простуди, не вживайте гострого чи солоного та не пийте багато рідини (особливо перед сном). Крім того, слід пам'ятати, що набряк – це звичайна реакція організму на хірургічне втручання.
- Щоб не виникло ускладнень, у день після операції не можна полоскати рот та їсти гарячу їжу. Протягом перших 7 днів вживайте лише рідку їжу (суп, бульйон, рідку кашу, фруктові та овочеві соки, тощо). Також не можна вживати алкогольні напої та палити.
- Щоб не виникло інфекції і рана краще загоювалася, на третій день після операції після кожного прийому їжі добре полоскайте рот розчином, який Вам призначив лікар.

- Для профілактики подразнень та опіків протягом 7 днів не користуйтеся своїми ополіскувачами для рота, дезінфікуючими розчинами, не вживайте рідину або їжу зі спеціями, кислотами, алкоголем та ін.
- Обов'язково приймайте призначені лікарем ліки, а також не пропускайте призначених візитів.

Рана м'яких тканин заживає повністю протягом двох тижнів.

Шви знімають через 7-10 діб, після чого слідкувати за гігієною можна у звичному режимі, рекомендується чистити зуби після кожного прийому їжі.

**Якщо у Вас виник найменший сумнів чи підозра в тому, що загоювання рани проходить не так, як потрібно, звертайтеся у клініку за телефонами:**

**Реєстратура: +38 050 645 95 65, +38 068 665 95 65**

**Лікар хірург-імплантолог Гулеватий Андрій Олександрович +38 067 223 01 17**

---

Пацієнт

---

Лікар